



biobovi-tr

Aditivo probiótico para bezerros e outros ruminantes jovens



Biobovi TR é um aditivo probiótico desenvolvido para o período de transição, de monogástrico a ruminante. Ocorre quando este deixa de alimentar-se apenas de leite e começa a ingerir outros tipos de alimentos, como volumoso e concentrado. Esta transição além de despertar interesse quanto à saúde do animal e sua qualidade de vida contribui para minimizar os custos na criação (Quigley, 1998).

BENEFÍCIOS

- ◆ Protege o intestino de diarreias bacterianas.
- ◆ Aumenta o consumo de matéria seca, dando mais arqueamento às costelas.
- ◆ Melhora a conversão alimentar.
- ◆ Melhora o ganho de peso e o desenvolvimento.
- ◆ Aumenta a absorção de nutrientes.
- ◆ Melhora a digestão dos alimentos.
- ◆ Estimula o sistema imunológico.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 1kg, embalado a vácuo, o que garante barreira contra oxigênio, a luz, a umidade e a gases.

MODO DE USAR

Adicionar o produto na ração segundo a espécie e dosagem recomendada.



ESTE PRODUTO DEVE PERMANECER REFRIGERADO EM FREEZER OU GELADEIRA, ENTRE 4 E 10°C

www.kerabrasil.com.br/downloads/kera_importancia_da_refrigeracao.pdf

EMPRESA COM SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS CERTIFICADO PELA DNV GL = HACCP =

DOSAGENS		
Espécie	6º ao 30º dia de vida	Recria a partir do 31º dia de vida
Bezerros	5g/cab/dia	10g/cab/dia
Potros	5g/cab/dia	10g/cab/dia
Cabritos	2g/cab/dia	5g/cab/dia
Cordeiros	2g/cab/dia	5g/cab/dia

NÍVEIS DE GARANTIA	
1g de Biobovi TR contém:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Saccharomyces cerevisiae</i>: 1 x 10¹⁰ UFC • <i>Pediococcus acidilactici</i>: 1 x 10⁹ UFC/g

DESEMPENHO DE BEZERROS DA RAÇA HOLANDESA COM BIOCALF E BIOBOVI-TR – UDESC – SC | Thaler Neto André et al.

Foram testados 31 bezerros, dos quais divididos entre CONTROLE (C) e PROBIÓTICOS (P) durante 12 semanas. Os bezerros receberam 5g/cab/dia de Biocalf do 4º ao 7º dia. A partir do 8º dia o lote P, passou a receber 5g/cab/dia de Biobovi-TR até o desleitamento e 10g/cab/dia de Biobovi-TR a partir de então.

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO		
Variáveis	CONTROLE (C)	PROBIÓTICO (P)
GPD (0-6 semanas)	0,332	0,421
GPD (1-12 semanas)	0,556	0,677
Peso final (kg/-)	88,57	97,97
Consumo total de ração (kg/dia)	1,216	1,322
Conversão alimentar às 12 semanas	3,096	2,662
Escore fecal (até 6 semanas)	1,389	1,018 (menos diarreia)
Escore fecal (7-12 semanas)	1,050	1,018

Conclusão: a suplementação com Biobovi-TR deu maior ganho de peso durante e após o aleitamento, melhorou a CA e diminuiu o escore fecal no aleitamento.

